

MOC, BY OSIĄGAĆ WIĘCEJ^{1,2}



Jardiance®
(empagliflozyna)



Dołącz JARDIANCE® jak najwcześniej,
aby osiągnąć więcej:

38%

REDUKCJA RYZYKA
ZGONU Z PRZYCYN
SERCOWO-NACZYNIOWYCH^{1,2}

35%

REDUKCJA RYZYKA
HOSPITALIZACJI Z POWODU
NIEWYDOLNOŚCI SERCA^{1,2}

39%

REDUKCJA RYZYKA WYSTĄPIENIA
LUB NASILENIA
NEFROPATII³

Jedyny iSGLT-2 zalecany przez ESC
w celu redukcji ryzyka zgonu
u pacjentów z cukrzycą typu 2
i chorobą sercowo-naczyniową⁴

Skuteczna redukcja:

- ▶ HbA_{1c}^{1,5}
- ▶ MASY CIAŁA^{1,5}
- ▶ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO^{1,5}



 **Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, tel.: (22) 699 0 699, fax: (22) 699 0 698
www.boehringer-ingelheim.pl • info.waw@boehringer-ingelheim.com

1. JARDIANCE® Charakterystyka Produktu Leczniczego, październik 2019. 2. Zinman B, Wanner C, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME® Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015; 373 (22): 2117-2128. 3. Wanner C, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME® Investigators. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016; 375 (4): 323-334. 4. Cosentino F et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases. 2019. 5. Haring H, Merker L, Seewaldt-Becker E, et al. EMPA-REG MET trial Investigators. Empagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 24-week, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care. 2014; 37 (6): 1650-1659. * Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2020.60), PC-PL-101502

